Zusammenstellung

des Inhalts

der

Entomologischen Zeitung. Jahrgang IV. 1843.


(Nach den Nummern.)

- No. 1. Januar. Verzeichniss der Mitglieder des Vereins. Vereinsangelegenheiten. Hering: Beiträge zur Insekten-Fauna Pommerns (Fortsetzung). Genera et species curculionidum a C. A. Schoenher, angezeigt vom R.-R. Schmidt. Suffrian: Berichtigungen und Nachträge zu dem Aufsatze über die Gyrien. Loew: Zur Verwandlungsgeschichte einiger Diptern aus der Abtheilung der Nemoceren und über ihre Stellung im Systeme. Kellner: Quedius riparius, eine neue Art. Intelligenz.
- No. 2. Februar. Vereinsangelegenheiten. Mittheilung an die Coleopterologen des Vereins, die Bestimmung der eingesendeten Käfer betreffend. Heer: über Trichopteryx (Kirby) (Ptilium, Schüppel). Mann: über den Artunterschied der Apatura Clytie von Apat. Ilia. Intelligenz.
- No. 3. März. Vereinsangelegenheiten. Für die Dipterologen des Vereins. Loew: über die Caprification der Feigen. v. Siebold: über die Fadenwürmer der Insekten. Erster Nachtrag. Klingelhöffer: Mittheilungen aus dem entomol. Tagebuche. Suffrian: Entomologische Bemerkungen. Intelligenz.
- No. 4. April. Vereinsangelegenheiten. Hartig: über die Anfertigung entomol. Lichtbilder. Schmitt: Entomol. Fragmente. Daniel: über Gastropacha Dumeti. von Siebold: Zusatz zu dem Rosenhauerschen Aufsatze über Xenos Rossii. Loew: über die Bedeutung des sogenannten Saugmagens bei den Zweiflüglern. Fischer von Rösslerstamm: Lithosia lurideola Zinck. ist eigene Art. Suffrian: Entomol. Bemerkungen (Forts.) von Weidenbach: entomol. Excursionen im Juni 1842 bei Kissingen. Suffrian: Rüge einer Insektenverfälschung. Intelligenz.

- No. 5. Mai. Vereinsangelegenheiten. Verzeichniss der zu bestimmenden Insekten-Familien. Germar: Lacordaire's Eintheilung der Erotylinen. Zeller: Asopia Lienigialis und Crambus Lienigiellus, zwei neue Falterarten. Eine lepidopterologische Excursion in die Steyrischen Alpen. Bischoff: über das Eierlegen der aufgespiessten Schmetterlinge. Freyer: die Falter der Reinthal-Alpe bei Reutte in Tyrol. Dieckhoff: über die galvanische Vergoldung der Nadeln als Schutzmittel gegen den Grünspan.
- No. 6. Juni. Vereinsangelegenheiten. Freyer: die Falter der Reinthal-Alpe (Schluss). Keferstein: über die schädlichen Heuschrecken. An die Leser der entomologischen Zeitung und sämmtliche Mitglieder des Vereins (Anzeige, dass der Dr. Schmidt, Vorsteher des Vereins, gestorben.)
- No. 7. Juli. Vereinsangelegenheiten. Dieckhoff: Nekrolog des Dr. Wilhelm Schmidt. Nachschrift des Vorstandes. Ratzeburg: Bericht über einige neue, den Waldbäumen schädliche Rhynchoten. Loew: Bemerkungen über die bekannten europäischen Arten der Gattung Chrysogaster Meig. Keferstein: über die schädlichen Heuschrecken (Fortsetzung.)
- No. 8. August. Vereinsangelegenheiten. An die entomologischen Correspondenten des verstorbenen Dr. Schmidt. v. Heyden: Ueber Insekten die an den Salinen leben. Zeller, Beschreibung zweier hermaphroditischer Falter. Keferstein: über die schädlichen Heuschrecken (Schluss). Loew: über das Genus Chrysogaster (Fortsetzung).
- No. 9. September. Vereinsangelegenheiten. Loew: über das Genus Chrysogaster Meig, (Schluss). Zeller: über Phalaena Tin. Xylostella Lin. Suffrian: Aphoristische Mittheilungen über die Umgebungen von Bad Ems in entomologischer Beziehung.
- No. 10. October. Vereinsangelegenheiten. Tabelle der im Winter 1843/44 zu bestimmenden Insekten. Suffrian: Bitte an Coleopterologen. Suffrian: Bad Ems in entomologischer Beziehung. (Schluss.) Zeller: die schlesischen Arten der Dipterngattung Sphegina. v. Kiesenwetter: über einige Myrmecophilen. Loew: Bemerkungen über die Gattung Milichia Meig. etc. Beobachtung an Musca erythrocephala. Stein: Aufforderung zur Einsendung von Schmarotzer-Insekten der höhern Thierklassen. Intelligenznachricht. Bitte und Erinnerung. Einladung zur Generalversammlung.
- No. 11. November. Vereinsangelegenheiten. Nachricht an die Lepidopterologen des Vereins. Loew: Bemerkungen über die Gattung Milichia Meig. (Schluss.) Suffrian: Entomologische Bemerkungen (Fortsetzung zu No. 4. des laufenden

Jahrgangs.) Loew: Beschreibung zweier neuen Cicindelen und Bemerkungen über eine angebliche Varietät der Cicindela campestris. Hering: Beiträge zur Insectenfauna Pommerns. (Fortsetzung zu No. 1. dieses Jahrganges.) Schmidt: C. J. Schoenherr genera et species curculionidum etc. Tom. VII. pars 1.

No. 12. December. Vereinsangelegenheiten. Hering: Beiträge zur Insektenfauna Pommerns (Forts.). v. Sie bold: Anfrage wegen eines Puppengespinnstes. Matz: über Orsodacna nigricollis. — Ist es an der Zeit, eine deutsche Käferfauna herauszugeben? Suffrian: Entomologische Bemerkungen. (Fortsetzung zu No. 11. dieses Jahrganges.)



Register

zum vierten Jahrgange

A.

Abrostala triplasia, urticae 358. Acanthotra chelus 350. Acontia solaris, luctuosa 359. Acridium peregrinum 178. Acronotus 136.

Acronycta 6, leporina, aceris 6, megacephala, alni, strigosa, tridens, psi, cusnis menyanthidis auricoma

pis, menyanthidis, auricoma rumicis, euphorbiae 7, abscondita 8.

Adexius 23.

Aegithomorphus 137.

Aegithus 136.

Aegorhinus 20. Agabus bipustulatus 332, carbonarius 333.

Aglossa Streatfieldii 143.

Agraphus 352.

Agrotis 9, vitta, aquilina, tritici, fumosa, suffusa, segetum, corticea, valligera, crassa, cinerea, tenebrosa 9.

Alexia 138.

Alophus 21. Amblyopus 133.

Amblyopus 133.

Amblyrhinus 349.

Amphidees 21.

Amphipyra 10 tragoponis, pyramidea, typica, pyrophila 10.

Amycterus 349.

Anarta myrtilli, cordigera, heliaca 359, Anisarthron barbipes 107. Anisodactylus pseudoaeneus

125, binotatus 126. Anisorhynchus bajulus, Sturmii,

barbarus, monachus 22.

Anthicus humilis 228.

Anthophila acnea 360.

Aomus 350.

A pamea nictitans 13, didyma, secalina, ophiogramma, furuncula, latruncula, strigilis, testacea, basilinea, infesta 14, unanimis, ophiogramma 362.

Apate Dufourii 86.
Apatura Clytic, Ilia 62.
Aphrastus 349.
Aptolemus 349.

Archines 349.

Arenaria marina 125. Asopia Lienigialis 139, sqq.

farinalis 140. Asteroscopus cassinea 356.

A terpus 20. A ula cocheilus 135.

ES.

Bacis 138. Barynotus 21.

Barytopus 137. Bastactes 22.

Bembidium lepidum 125, rupestre, celere, guttula 126. Bestimmungs-Tabelle 130, 291. Blastophaga grossorum, Sycomori 71.

Bledius bicornis 126, tricornis 228, 334.

Borborocetes 24. Bostrichus dispar 87. Bothynorhynchus 349. Brachymerus 137. Brachypus 352.

Brachysphoenus 136.

Brephos parthenias, notha 360. Brotheus 24.

Bryophila, perla, spoliatricula 8. Bustomus 350.

Byrsopages 21.

Byrsops, Byrsopsides 24.

Calpe libatrix 15. Campylomyza 29. Caprificatio 66. Carabus auratus 89.

Caradrina morpheus, cubicularis, blanda, alsines, trilinea 17. respersa 17, 363.

Cassida nigra wird erbeten 291. Cataephia alchymista 360.

Catalatus 350. Catapionus 21. Caterectus 352.

Catergus 352. Cathormiocerus 350.

Catocala fraxini, elocata, nupta, sponsa, promissa, electa, para-

nympha 360. Catoptes 21. Cecidomyia 29. Celeuthetes 350.

Cepurus 22.

Cerastis vaccinii, erythrocephala, glabra, satellitia 348. Ceratopogon 27 geniculatus,

flavifrons, bipunctatus 28.

Cercopeus 350.

Ceutorhynchus macula-alba 88. Cheilosia 206.

Chermes abietis 201, viridis, coccineus 202.

Chilo Zinckenellus 139,

Chiloneus 350. Chloebius 352.

Chrysogaster 204 sqq. splendens 209, violacea 210, metallica, discicornis 211, bicolor, coerulescens, cupraria 212, longicornis 240, chalybeata 241, simplex 243, incisa 245, coe-meteriorum 246, viduata 248, Macquarti 250, hirtella 251, grandicornis 253, discicornis, aenea 254, tarsata 255, splendida 258, amethystina 260, insignis 261, nobilis 262, plumbago 268, brevicornis 269, frontalis 270, fumipennis 271, geniculata, elegans 273 (Tabelle 276, 277, 278.) Zetterstedt's Genus Chrysogaster 278 sqq. Chrysolopus 20.

Cicindelen neue 337, C. octopunctata 339. C. quadri naculata 340, littoralis 341. C. campestris var. Suffriani 342.

Cladeyterus 350.

Cleonides 19. Cleonus imperialis 19, glaucus, major (olim Larinus inquinatus), ericeti, testatus, concinnus, excoriatus, roridus, cinereus, palmatus, bicarinatus 20.

Cleophana pinastri, rectilinea, perspicillaris, linariae 356.

Coccimorphus 136.

Coccinella 93. C. concolor 93. Coccus 201, cacti 203, racemosus 204.

Coleophora rectilineella 146. Coniatus 24.

Cordyla 29.

Corynomalus 136.

Cosmia fulvago, Oo, acetosellae, trapezina, subtosa, pyrolina 348. Cosmorhinus 359.

Crambus Lienigiellus 139 sqq. chrysonuchellus, aridellus 142.

Cucullia abrotani, absinthii, artemisiae 356, tanaceti, umbratica, lactucae, chamomillae. asteris, thapsifaga 357, verbasci, scrophulariae 358.

Cycliscus 359. Cyclomorphus 136. Cyclomus 349. Cylindrorhinus 23. Cynips ficus, caricae. sycomori 73. sqq. Cyphicerus 349. Cyrtomorphus 135.

ID. Dasytes flavipes 334, punctiger.

scaber 336, nigricornis, virens

Dacne 132.

337.

Dicerca berolinensis 87. Dinarda dentata, Maerkelii 307, 308. Diphtera, coenobita, Orion 8. Dyticus consobrinus, parallelogrammus 94. BC. Ellimenistes 350. Elophilus 205. Elytrodon 352. Elytrurus 351. Embrithes 351. Encaustes 132. Entomologische Lichtbilder 98. Ephisternus 139. Ephydra salina 228. Epicaerus 22. Epipedus 25. Epiphaneus 351. Episcapha 132. Episema, coeruleocephala, graminis 9. Episomus 349. Erastria sulphurea, unca 359. fuscula, candidula, paula 360. Eremnus 351. Eriopus pteridis 12. Eristalis 205. Erotylinen 131 sqq. Erotylus 137. Eublepharus Roueleti, Germari 20, 21. Euclidia glyphica, mi 361. Eupages 24. Euphanistes 136. Eupholus 21.

Eurycardius 137.

Eurylobus 21. Eustylus 349.

丽7.

Fadenwürmer 78 sag. Filarien 78 sqq.

Gi.

Gallerucae 91. Gastropacha dumeti 110, 362. catax. 362. Geometra lichenaria 231. Geonemus 21. Gortyna leucostigma 346, micacea, flavago, luteago 347. Gordius aquaticus 78. Gracilia pyygmaea 105. Graphol, alpestrana, montanana. caliginosana 144. Gronops 20. Gryllus italicus 219, migratorius 220. Gyrinen 25. G. natator 25. mergus, colymbus, elongatus, ma-

BO.

370 sag.

rinus, aeneus 26, opacus 27.

Habrodactylus 136. Hadena saponariae, capsincola, cucubali, popularis, leucophaea. lutulenta, dentina, atriphicis, adusta, remissa 11. Solierii, thalassina, gemina, remissa, genistae, contigua, protea glauca 362. Hadrorhinus 350. Harpyia erminea 362. Heliotis dipsacea, scutosa, marginata, delphinii 359. Helophilus 205. Hermaphroditische Falter 229. Heuschreckenplage 167 sqq. Mittel dagegen 237. Hipparchia Janira 230. Hipporhinus quadridens 21. Holcorhinus 350. Hormotrophus 349. Hydroporus enneagrammus, ni-

grolineatus 95.

Hygrotophila 138.

Hylesinus hederae 108. Hylobius 22.

Hypera Kunzii, straminea, sublineata 23, picipes, phaeopa, haemorrhoidalis, canescens, viciae, borealis, trifolii, fulvipes 24. Hyperaspis 93.

Hyphantus 352. Hypocolobus 25.

Hypsonotus comprimatus, catheloplateus 20.

H.

Iphiclus 136. Ischyrus 133. Isomerinthus 351.

MA

Kymatophora, xanthoceros, bipunctata, Or, flavicornis 8.

N.

Lalagates 350. Lampronia rupella 146. Laparocerus 351. Lasioptera 29, juniperina 30. Leiosomus ovatulus, cribrum, impressus, deflexus 23. Lema asparagi, pupillata 122, Erichsonii, brunnea 123. Lepidophorus 21. Leptinus testaceus 47. Leptops 21. Lepyrus 22. Leucania pallens, impura, lithargyrea, albipuncto, conigera. obsoleta 343, comma, 1 album Lina populi, tremulae 85. Liophloeus 21. Liparis ancilla 362. Listroderes 21. Lithinus 21. Lithodus 24. Lithosia lurideola, complana 119 sqq. Lixus 352. Lobetorus 350.

Lophodes 20.

Lophotus, nodipennis, Esch-scholtzi 20.

Lordops 20. Lybas 135.

Lycaena alsus, hippothoë, W album 361.

NI.

Macrocorynus 349. Macroglossa milesiformis, bombyliformis 362. Macropeza 29. Macrops 349. Macrotarsus 23. Mamestra pisi, splendens, oleracea, suasa 14, chenopodii, brassicae, persicariae 15, aliena, nigricans 14, 362, abjecta, albicolon 15, 362. Megalometis 22. Megaproctus 136. Merimnetes 351. Mermis nigrescens 79, albicans 80. Milichia 310 sqq., maculata 324 formosa 328. Minyops carinatus 22. Miselia conspersa, comta, oxyacanthae, aprilina 12. Mithymna turca, xanthographa, texta 15. Molytes coronatus 22. Morphoides 137. Musca erythrocephala 314. Mycetobia 31. Mycetophila 29. Mycophtorus 133. Mycotretus 133. Mylacus 350. Myllocerus 349. Myrmecophilen 306.

hwylomertn.N. 350.

Nachtfang der Käfer 89. Nastus 352. Necrolog des Dr. W. L. E. Schmidt 194 sqq. Necrophorus germanicus 88. Nemoceren 27. Noctua ravida, augur, sigma, baja, brunnea, Dahlii, festiva, bella, plecta 10, triangulum 10, 362,

Nonagria despecta, fluxa 344, fulva, neurica, nexa 345, paludicola, sparganii, cannae, typhae 346.

Notodonta tritophus 362.

0. Occylotrachelus 349. Odontorhinus 21. Oecophora noricella, inspersella 151. Omias 350. Ommojotelus 138. Oocyanus 133. Oogaster 137. Ophiusa lusoria, pastinum 360. Orsodaena nigricolls, cerasi 364. sag.

Orthoneura 207. Orthosia instabilis, rubricosa, munda, ypsilon, lota, macilenta, gracilis, opima, gothica, stabilis, miniosa, cruda, congener, litura 16. populeti 16, 363.

Othius myrmecophilus 308. Otiorhynchus 351. Oxypoda familiaris, cuniculina 307.

Pacholenus 352. Pachycerus 20. Panscopus 22. erynaceus 22. Pantopoeus 351. Pelorhinus 20. Perieges 24. Peritelus 350. Perperus 22. Phalaena Tin. Xylostella 281. Phaylomerintus 350. Phlogophora meticulosa, lucipara 12, 362. Phlyctinus 350. Pholicodes 351, Phyllobius 349. Phytonomus philanthus, punctatus. Pollux, palustris, alternans,

lygoni, meles, trilineatus, dissimilis 24. Phytoscapus 352. Phyxelis 350. Piezoderes 350. Plastologus 20. Platypteryx pinula, curvatula falcula, hamula, unguicula, lacertula, sicula 361. Platytrachelus 349. Plinthus Tischeri, caliginosus, 23. Plusia moneta, concha, festucae. chrysitis, jota, gamma, interrogationis 358. Plut. xylost. 28I, cruciferarum 283. Polia chi 12, serena, dysodea, advena, tincta, nebulosa, occulta,

Kunzii, Julinii, murinus 23, po-

herbida 13. Porpacus 350. Priotelus 138. Procas picipes, pyrrhodactylus 22. 24. Prypnus 21.

Pselaphacus 132. Psomeles 351. Psychoda 29. Ptilina 60. Ptilium 39, flavum 47. Ptochus 350.

Pyralis farinalis, glaucinalis, pictalis 142, marginatus 143. Pyrgops 351.

Quedius riparius, fulgidus, lucidulus 31.

HE.

Rhyparosomus 21. Rhytidophloeus albipes 22. Rhytirhinus 24.

Salinen - Insecten 227. Saugmagen der Dipteren 114, sqq. Scaeva 206. Scaphidium 47.

Scaphidomorphus 137. Scaphisoma 47.

Schmarotzer-Insecten der höhern Thierclassen 316 sqq. Sciara 29 an fungicola 30. Sciobius 351.

Scrobius 331.

Scopaeus pusillus 309, minutus 310.

Scotasmus 23. Scotoeborus 349.

Seymnus frontalis 330 didymus, binotatus, bisbipustulatus, quadrivulnerus, quadriverrucatus, quadripustulatus 331.

Simulia 29.

Simyra venosa 17, nervosa 19. Siteytes 352.

Spartecerus 24.

Sphaerius 139. Sphegina clunipes 302, elegans,

nigra 304, Loewii 305. Sphenoxus 137. Sternolobus 136.

Stomodes 350. Strangaliodes 21.

Strepsipteren 113. Styliscus 349.

Styliscus 349.
Sycophaga crassipes 73, sycomori 74. sqq.
Sympiezorhynchus 350.

Synthocus 24.

Syrphus 206.

T.

Tanysphyrus 22.
Thyatira batis, derasa 15.
Tillus ambulans, elongatus 123,
hyalinus, albofasciatus 123,
unifasciatus 124.

Tinea rupella 146.

Tortrix decimana, Wahlbomiana, tesserana, 145 cirsiana, paedisca, chalybeana 150.

Trachea praecox, porphyrea, piniperda 13.

Trachyphloeus 350.

Trichopteryx 39, testacea 41, Kunzii 41, fascicularis 46, 60 atomaria, sericans, evanescens, minutissima 61.

Triglochin maritimum 125.
Triphaena subsequa 10 pronuba, fimbria, linogrisea 11.
Triplatoma 132.
Triplax 133, 134, 135.

Tritoma 135, 139.
Tropiphorus mercurialis 21, carinatus, globatus 22.

Trysibius 22. Tyloderes 351.

V.

Vergoldete Nadeln 159.

X.

Xanthia echii, ochroleuca, rufina, ferruginea, citrago, aurago, silago, gilvago, cerago, palleago 347.

Xenos Rossii 113.

X ylin a vetusta 354, exoleta, solidaginis, conformis, rhizolitha, petrificata, conspicillaris, putris, rurea, hepatica, polyodon, lithoxylia, latericia, virens 355.

Z.

Zonarius 137.



Berichtigung von Druckfehlern


in Prof. Heer's Abhandlung


Badastüber Da slorigam


Trichopteryx.


Pag. 39. sqq. dieses Jahrg.

		HIDER							
Seite	41.	Zeile	14	von	oben	statt	Tasche lies	Furche.	
2)	47.	20	6	20	unten	23	hergehe »	hergebe.	
20		MILITAN I	5	20	20	20	Rückenleil	osegm. lie	S
							Hinterl	eibsegm.	
23					oben	20	gerundet li	es gerandet.	
20		n			I Coll	20	Rückenseit	e lies Bauch	-
							seite.		
2)	52.	»	29	onq) N	33	die lies den	PERFECTION 19	
,,	52.		33	w	20	streic	che das Wort	nur.	
20	52.			21	unten	statt	considerat	iones lies ob	-
0.0	0.2.						servatio	nes.	
33	53.		19	. 20	oben	30	beiläufig l		
10	54.		12	22	20	20	den achten	lies das achte	
p	55.		29	20	20	20	Brustseite	lies Bauch	-
-111	oleuc		Title						
.000 10	58.	20	23	20 30	20	streic	che das Wort	daher.	
Heage	58.	20	3	20	unten	33	20 20	allein.	
	59.	n	11		oben	statt	Schenkeln	lies Schenkel	-
Tible 1	Jan A		in the		Tiller V		ringen.		1
	59	- >>	12	n al	20	10	beierstere	n die Schen	
		Hisiga						ge lies di	
							Erstere		
	59.	13 THY	17	10 181	29	*	Schenkel 1	ies Schenkel	-
	00.		32						
2)	59		. 8	20	unten	(AI	merk.) statt	ersten lie	S
	00.					1	letzten.		
>>	60.	20	23	20	33	statt	membranac	eo lies mem	-
	00.						braneo.		
20	60	20	15	20	20	33	segmentis	l. sequentibus	
- 10								4	











H. Loew del.

